



Рак желчного пузыря: заболеваемость, факторы риска, диагностика

Ю.Л. Тонких, А.В. Васютин, В.В. Цуканов

DOI:

Рак желчного пузыря (РЖП) встречается достаточно редко, но среди всех видов рака желчевыводящих путей является самым распространенным. РЖП отличается высокой злокачественностью с 5-летней выживаемостью < 10%

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ



наиболее высокая заболеваемость РЖП в Азии, Индии, среди коренного населения Америки, в Корее



у женщин РЖП может встречаться в среднем в 3 раза чаще, чем у мужчин



более 2/3 больных РЖП старше 65 лет

ФАКТОРЫ РИСКА



желчнокаменная болезнь

ОР = 3,01–23,8



этническая принадлежность



генетическая предрасположенность



образ жизни (ожирение)



инфекции желчевыводящих путей

ДИАГНОСТИКА

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Японского общества гепато-билиарно-панкреатической хирургии, 2021 г.



профилактическая холецистэктомия не рекомендуется

СИМПТОМЫ РЖП



боли в верхней правой области живота



желтуха



тошнота, рвота



потеря массы

1



исследование крови (биохимия) и УЗИ
выявление РЖП

2



КТ
оценка локализации и распространения опухоли

3



эндоскопическое УЗИ
обнаружение утолщенной части желчного пузыря
прямая холангиография
оценка распространения опухоли на пузырный проток и общий желчный проток
ПЭТ/КТ
обнаружение лимфоузлов, метастазов и рецидивов