

Факторы риска развития абдоминального ожирения у жителей Санкт-Петербурга молодого и среднего возраста

О.Д. Беляева, О.А. Беркович, Е.И. Баранова, Д.А. Колодина


DOI: 10.31550/1727-2378-2023-22-8-40-46

Обследовано 966 ЧЕЛОВЕК. Из них:

503 ЧЕЛОВЕКА (52,1%)


ГРУППА С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ (АО)*

*Критерий АО — окружность талии (ОТ) ≥ 80 см у женщин и ≥ 94 см у мужчин









50 ЧЕЛОВЕК

ГРУППА СРАВНЕНИЯ БЕЗ АО



ПАРАМЕТРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ АО



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПОШАГОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ РАЗВИТИЕ АО

$$y = \exp(\psi) / (1 + \exp(\psi))$$

где $\psi = 1,23 \times X1 + 0,11 \times X2 + 1,42 \times X3 + 0,74 \times X4 + 0,32 \times X5 + 0,19 \times X6 + 0,03 \times X7 - 0,01 \times X8 - (B)7,14$

B — свободный член